

多発性骨髄腫レジメナー覧

番号	プロトコール名称	1 コース の 日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
1	weeklyベルケイドSC	35	1	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			1	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			2	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			8	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			8	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			9	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			15	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			15	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			16	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			22	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			22	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			23	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
2	ベルケイドSC	21	1	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			1	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			2	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			4	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			4	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			5	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			8	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			8	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			9	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			11	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			11	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			12	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
3	Highdose-CPA	14	1	注射用エンドキサン	2000mg/m ²	2時間かけて
			2	注射用エンドキサン	2000mg/m ²	2時間かけて
4	大量アルケラン・ MEL200	21	1	アルケラン静注用	100mg/m ²	30分かけて
			2	アルケラン静注用	100mg/m ²	30分かけて
5	VAD	28	1	オンコビン注射用	0.4mg/Body	24時間持続
			1	アドリアシン注用	9mg/m ²	24時間持続
			1	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			2	オンコビン注射用	0.4mg/Body	24時間持続
			2	アドリアシン注用	9mg/m ²	24時間持続
			2	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			3	オンコビン注射用	0.4mg/Body	24時間持続
			3	アドリアシン注用	9mg/m ²	24時間持続
			3	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			4	オンコビン注射用	0.4mg/Body	24時間持続
			4	アドリアシン注用	9mg/m ²	24時間持続
			4	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			9	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			10	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			11	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			12	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			17	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			18	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			19	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			20	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服

多発性骨髄腫レジメナー覧

番号	プロトコール名称	1コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
6	隔週ベルケイドSC	28	1	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			1	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			2	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			15	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			15	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			16	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
7	PA d	28	1	アドリアシン注用	20mg/m ²	ゆっくりと
			1	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			1	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			2	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			3	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			4	アドリアシン注用	20mg/m ²	ゆっくりと
			4	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			4	レナデックス錠 4 mg	10錠	内服
			8	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
8	FLU（原発性マクログロブリン血症）	28	1	フルダラ静注用	25mg/m ²	30分かけて
			2	フルダラ静注用	25mg/m ²	30分かけて
			3	フルダラ静注用	25mg/m ²	30分かけて
			4	フルダラ静注用	25mg/m ²	30分かけて
			5	フルダラ静注用	25mg/m ²	30分かけて
9	KRd（1コース目）	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	カイプロリス点滴静注用	20mg/m ²	10分かけて
			1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			2	デキサート注射液 3. 3 mg	1 A	30分かけて
			2	カイプロリス点滴静注用	20mg/m ²	10分かけて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			8	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			9	デキサート注射液 3. 3 mg	1 A	30分かけて
			9	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			16	デキサート注射液 3. 3 mg	1 A	30分かけて
			16	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて			

多発性骨髄腫レジメナー覧

番号	プロトコール名称	1 コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
10	KRd(2~12コース目)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			2	デキサート注射液 3. 3 mg	1 A	30分かけて
			2	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			8	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			9	デキサート注射液 3. 3 mg	1 A	30分かけて
			9	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			16	デキサート注射液 3. 3 mg	1 A	30分かけて
			16	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
11	KRd(13コース目以降)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			2	デキサート注射液 3. 3 mg	1 A	30分かけて
			2	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
			16	デキサート注射液 3. 3 mg	1 A	30分かけて
			16	カイプロリス点滴静注用	27mg/m ²	10分かけて
12	DB d (3 w・初回用)	21	1	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			1	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			1	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 50ml/hにて 次の1hr 100ml/hにて 以後 150ml/h→200ml/hとする
			2	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			4	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			4	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			5	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			8	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 50ml/hにて 次の1hr 100ml/hにて 以後 150ml/h→200ml/hとする
			9	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			11	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			11	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			12	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
15	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて			

多発性骨髄腫レジメナー覧

番号	プロトコール名称	1 コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
13	DB d (3w・2~3回 目用)	21	1	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			1	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			1	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			2	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			4	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			4	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			5	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			8	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			9	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			11	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			11	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			12	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
14	DB d (3w・4~8回 目用)	21	1	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			1	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			1	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			2	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			4	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			4	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			5	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			9	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			11	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			11	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
15	D d (9回目以降用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			1	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて

多発性骨髄腫レジメナー覧

番号	プロトコール名称	1 コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
16	E L d (初回用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			1	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	最初の30分 30ml/hにて 次の30分 60ml/hにて 以後 1hr 120ml/hにて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			8	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	最初の30分 180ml/hにて 以後1hr 240ml/hにて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			22	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
17	E L d (2回目用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			1	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			8	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			22	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
18	E L d (3回目以降用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			1	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
19	DL d (4 w・初回用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			1	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 50ml/hにて 次の1hr 100ml/hにて 以後 150ml/h→200ml/hとする
			2	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 50ml/hにて 次の1hr 100ml/hにて 以後 150ml/h→200ml/hとする
			9	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			15	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			16	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			22	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			23	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて

多発性骨髄腫レジメナー覧

番号	プロトコール名称	1 コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
20	DL d (4 w・2 回目用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			1	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			2	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			9	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			15	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			16	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			22	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
21	DL d (4 w・3 ~ 6 回目用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			1	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			2	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			15	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
			16	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A	30分かけて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			22	DL d (4 w・7 回目以降用)	28	1
1	レブラミドカプセル 5 m g	5 C				Day 1 から 2 1 まで内服
1	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg				1hr 100ml/hにて 次の1hr 150ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて
2	デキサート注射液 3. 3 mg	5 A				30分かけて
8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A				30分かけて
15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A				30分かけて
22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A				30分かけて

多発性骨髄腫レジメナー覧

番号	プロトコール名称	1 コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
23	EPd (初回用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	最初の30分 30ml/hにて 次の30分 60ml/hにて 以後1hr 120ml/hにて
			1	ポマリストカプセル 4 m g	1 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			8	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	最初の30分 180ml/hにて 以後1hr 240ml/hにて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
22	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて			
24	EPd (2回目用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			1	ポマリストカプセル 4 m g	1 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			8	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
22	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて			
25	EPd (3回目用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	エムプリシティ点滴静注用	20mg/kg	最初の30分 180ml/hにて 次の30分以降240ml/hにて
			1	ポマリストカプセル 4 m g	1 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			22	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	1hr 300ml/hにて
26	EPd (4回目以降用)	28	1	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			1	エムプリシティ点滴静注用	20mg/kg	1hr 300ml/hにて
			1	ポマリストカプセル 4 m g	1 C	Day 1 から 2 1 まで内服
			8	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			15	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
			22	デキサート注射液 3. 3 mg	10 A	30分かけて
27	VRD-lite	35	1	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			1	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			1	レブラミドカプセル 5 m g	3 C	Day1から 2 1 まで内服
			2	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			8	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			8	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			9	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			15	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			15	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			16	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
			22	ベルケイド注射用 3 mg	1.3mg/m ²	皮下注射
			22	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服
23	レナデックス錠 4 mg	5錠	内服			