

# 大腸癌レジメン一覧

マス	プロトコール名称	1 コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
1	mFOLFOX 6	14	1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
2	FOLFOX4	14	1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	600mg/m <sup>2</sup>	22時間かけて
			2	レボホリナート点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			2	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			2	5-FU注	600mg/m <sup>2</sup>	22時間かけて
3	FOLFIRI	14	1	カンプト点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
4	ベクティビックス+m FOLFOX 6	14	1	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	1時間かけて
			1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
5	ベクティビックス+ FOLFIRI	14	1	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	1時間かけて
			1	カンプト点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
6	アービタックス【初回 用】	7	1	アービタックス注射液	400mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
7	アービタックス【2回 目以降】	7	1	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて

# 大腸癌レジメン一覧

マス	プロトコール名称	1コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
8	アービタックス+mF OLFOX6【初回】	14	1	アービタックス注射液	400mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
			8	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて
9	アービタックス+mF OLFOX6【2回目以降】	14	1	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて
			1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
			8	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて
10	アービタックス+ FOLFIRI【初回】	14	1	アービタックス注射液	400mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	カンプト点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
			8	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて

# 大腸癌レジメン一覧

マス	プロトコール名称	1 コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
11	アービタックス+ FOLFIRI 【2回目以降】	14	1	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて
			1	カンプト点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
		14	8	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて
12	IFL+アバスタチン	42	1	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	20mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	500mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	アバスタチン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			8	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			8	レボホリナート点滴静注用	20mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			8	5-FU注	500mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			15	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			15	レボホリナート点滴静注用	20mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			15	5-FU注	500mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			15	アバスタチン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			22	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			22	レボホリナート点滴静注用	20mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
22	5-FU注	500mg/m <sup>2</sup>	15分かけて			
29	アバスタチン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分			
13	IFL	42	1	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	20mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	500mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			8	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			8	レボホリナート点滴静注用	20mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			8	5-FU注	500mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			15	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			15	レボホリナート点滴静注用	20mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			15	5-FU注	500mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			22	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			22	レボホリナート点滴静注用	20mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			22	5-FU注	500mg/m <sup>2</sup>	15分かけて

# 大腸癌レジメン一覧

マス	プロトコール名称	1コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
14	ベクティビックス	14	1	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	1時間かけて
15	mFOLFOX6 + アバチン	14	1	アバチン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
16	FOLFOX4+ アバチン	14	1	アバチン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	600mg/m <sup>2</sup>	22時間かけて
			2	レボホリナート点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			2	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			2	5-FU注	600mg/m <sup>2</sup>	22時間かけて
17	ゼローダ+アバチン	21	1	ゼローダ錠300	1000mg/m <sup>2</sup>	【1日2回、14日間】
			1	アバチン点滴静注用	7.5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
18	SOX	21	1	ティーエスワン配合OD錠	80mg/m <sup>2</sup>	【14日間内服 夕開始】
			1	エルプラット点滴静注液	130mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
19	アービタックス隔週+ mFOLFOX6 【初回】	14	1	アービタックス注射液	500mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて

# 大腸癌レジメン一覧

マス	プロトコール名称	1 コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
20	アービタックス隔週+mFOLFFOX6【2回目以降】	14	1	アービタックス注射液	500mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて
			1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
21	XELOX	21	1	エルプラット点滴静注液	130mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	ゼローダ錠300	2000mg/m <sup>2</sup>	【14日間内服】
22	XELOX+アバスチン	21	1	アバスチン点滴静注用	7.5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	エルプラット点滴静注液	130mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	ゼローダ錠300	2000mg/m <sup>2</sup>	【14日間内服 夕開始】
23	XEIRI+アバスチン	21	1	アバスチン点滴静注用	7.5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	カンプト点滴静注	200mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	ゼローダ錠300	1600mg/m <sup>2</sup>	【14日間内服 夕開始】
24	IRIS (CPT-11 ; 125mg/m <sup>2</sup> )	28	1	カンプト点滴静注	125mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	ティーエスワン配合OD錠	80mg/m <sup>2</sup>	【14日間内服】
			15	カンプト点滴静注	125mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
25	IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m <sup>2</sup> )	28	1	アバスチン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	ティーエスワン配合OD錠	80mg/m <sup>2</sup>	【14日間内服】
			15	アバスチン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			15	カンプト点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	90分かけて

# 大腸癌レジメン一覧

マス	プロトコール名称	1コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
26	サイラムザ+FOLFIRI	14	1	サイラムザ点滴静注用	8mg/kg	1時間かけて
			1	カンプト点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
27	FOLFOXIRI+アバ <sup>ス</sup> チン	14	1	アバ <sup>ス</sup> チン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	カンプト点滴静注	165mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	3200mg/m <sup>2</sup>	48時間かけて
28	FOLFOXIRI	14	1	カンプト点滴静注	165mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	3200mg/m <sup>2</sup>	48時間かけて
29	sLV5FU2+アバ <sup>ス</sup> チン	14	1	アバ <sup>ス</sup> チン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
30	SOX+アバ <sup>ス</sup> チン	21	1	アバ <sup>ス</sup> チン点滴静注用	7.5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	エルプラット点滴静注液	130mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	ティーエスワン配合OD錠	80mg/m <sup>2</sup>	【14日間内服・夕開始】
31	FOLFIRI+アバ <sup>ス</sup> チン	14	1	アバ <sup>ス</sup> チン点滴静注用	5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	カンプト点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて
32	XELOXIRI+アバ <sup>ス</sup> チン	21	1	アバ <sup>ス</sup> チン点滴静注用	7.5mg/kg	90分かけて 2回目60分 3回目以降30分
			1	カンプト点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて
			1	エルプラット点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			2	ゼローダ錠300	1700mg/m <sup>2</sup>	【14日間内服】

## 大腸癌レジメン一覧

マス	プロトコール名称	1 コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
33	ザルトラップ+FOLFIRI	14	1	ザルトラップ点滴静注	4mg/kg	60分かけて
			1	カンプト点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	90分かけて
			1	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて
			1	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	15分かけて
			1	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間かけて

2020/5/25 現在