

胃癌レジメン一覧

| 番号 | プロトコール名称 | 1コース の日数 | DAY | 薬剤名称 | 投与量 | 投与方法 |
|----|---------------------------------|-------------|-----|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | ハーセプチン+XP 【初回】 | 21 | 1 | ハーセプチン注射用 | 8mg/kg | 90分かけて |
| | | 21 | 1 | ランダ注 | 80mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 21 | 1 | ゼローダ錠 | 2000mg/m ² /日 | 【14日間内服・夕開始】 |
| 2 | ハーセプチン+XP 【2回目以降】 | 21 | 1 | ハーセプチン注射用 | 6mg/kg | 60分かけて 以降30分 かけて |
| | | 21 | 1 | ランダ注 | 80mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 21 | 1 | ゼローダ錠 | 2000mg/m ² /日 | 【14日間内服・夕開始】 |
| 3 | カンプト(B法) | 28 | 1 | カンプト点滴静注 | 150mg/m ² | 90分かけて |
| | | 28 | 15 | カンプト点滴静注 | 150mg/m ² | 90分かけて |
| 4 | Weeklyパクリタキセル (胃Ca) | 28 | 1 | パクリタキセル注射液 | 80mg/m ² | 1時間かけて |
| | | 28 | 8 | パクリタキセル注射液 | 80mg/m ² | 1時間かけて |
| | | 28 | 15 | パクリタキセル注射液 | 80mg/m ² | 1時間かけて |
| 5 | TS-1+パクリタキセル | 21 | 1 | パクリタキセル注射液 | 50mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 21 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 60mg/m ² /日 | 【14日間投与】 |
| | | 21 | 8 | パクリタキセル注射液 | 50mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 21 | 8 | ティーエスワン配合OD錠 | 60mg/m ² /日 | 【14日間投与】 |
| 6 | TS-1+DOC | 21 | 1 | ドセタキセル点滴静注 | 40mg/m ² | 1時間かけて |
| | | 21 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² /日 | 【14日間投与！！】 |
| 7 | TS-1+CDDP (S1:2 投1休、CDDP:d8) | 21 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² /日 | 【14日間投与】 |
| | | 21 | 8 | ランダ注 | 60mg/m ² | 2時間かけて |
| 8 | TS-1+CDDP+DOC (JCOG1013) | 28 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² /日 | 2投2休 |
| | | 28 | 1 | ランダ注 | 60mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 28 | 1 | ドセタキセル点滴静注 | 40mg/m ² | 1時間かけて |
| 9 | アブラキサン(胃Ca) | 21 | 1 | アブラキサン点滴静注用 | 260mg/m ² | 30分かけて |
| 10 | TS-1+CDDP+DOC (mDCS) | 21 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² /日 | 2投1休 |
| | | 21 | 8 | ドセタキセル点滴静注 | 50mg/m ² | 60分かけて |
| | | 21 | 8 | ランダ注 | 60mg/m ² | 90分 |

胃癌レジメン一覧

| 番号 | プロトコール名称 | 1コース の日数 | DAY | 薬剤名称 | 投与量 | 投与方法 |
|----|------------------------------------|-------------|-----|--------------|--------------------------|-----------------|
| 11 | CPT-11+CDDP | 28 | 1 | カンプト点滴静注 | 60mg/m ² | 90分かけて |
| | | 28 | 1 | ランダ注 | 30mg/m ² | 90分かけて |
| | | 28 | 15 | カンプト点滴静注 | 60mg/m ² | 90分かけて |
| | | 28 | 15 | ランダ注 | 30mg/m ² | 90分かけて |
| 12 | サイラムザ単剤 | 14 | 1 | サイラムザ点滴静注用 | 8mg/kg | 1時間かけて |
| 13 | G-SOX (L-OHP130mg/m ²) | 21 | 1 | エルプラット点滴静注液 | 130mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 21 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² | 【14日間内服・夕開始】 |
| 14 | サイラムザ+パクリタキセル | 28 | 1 | サイラムザ点滴静注用 | 8mg/kg | 1時間かけて |
| | | 28 | 1 | パクリタキセル注射液 | 80mg/m ² | 60分かけて |
| | | 28 | 8 | パクリタキセル注射液 | 80mg/m ² | 60分かけて |
| | | 28 | 15 | サイラムザ点滴静注用 | 8mg/kg | 1時間かけて |
| | | 28 | 15 | パクリタキセル注射液 | 80mg/m ² | 60分かけて |
| 15 | ハーセプチン+XELOX 【初回】 | 21 | 1 | ハーセプチン注射用 | 8mg/kg | 90分かけて |
| | | 21 | 1 | エルプラット点滴静注液 | 130mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 21 | 1 | ゼローダ錠 | 2000mg/m ² /日 | 【14日間内服・夕開始】 |
| 16 | ハーセプチン+XELOX 【2回目以降】 | 21 | 1 | ハーセプチン注射用 | 6mg/kg | 60分かけて 以降30分かけて |
| | | 21 | 1 | エルプラット点滴静注液 | 130mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 21 | 1 | ゼローダ錠 | 2000mg/m ² /日 | 【14日間内服・夕開始】 |
| 17 | ハーセプチン+G-SOX(初回) | 21 | 1 | ハーセプチン注射用 | 8mg/kg | 90分かけて |
| | | 21 | 1 | エルプラット点滴静注液 | 130mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 21 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² /日 | 【14日間内服・夕開始】 |
| 18 | ハーセプチン+G-SOX(2回目以降) | 21 | 1 | ハーセプチン注射用 | 6mg/kg | 60分かけて 以降30分かけて |
| | | 21 | 1 | エルプラット点滴静注液 | 130mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 21 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² /日 | 【14日間内服・夕開始】 |
| 19 | XELOX | 21 | 1 | ゼローダ錠 | 2000mg/m ² /日 | 【14日間内服】 |
| | | 21 | 1 | エルプラット点滴静注液 | 130mg/m ² | 2時間かけて |
| 20 | XP | 21 | 1 | ゼローダ錠 | 2000mg/m ² /日 | 【14日間投与】 |
| | | 21 | 1 | ランダ注 | 80mg/m ² | 2時間かけて |

胃癌レジメン一覧

| 番号 | プロトコール名称 | 1コース の日数 | DAY | 薬剤名称 | 投与量 | 投与方法 |
|----|-----------------------------------|-------------|-----|--------------|------------------------|----------|
| 21 | TS-1+CDDP (S1: 3 投2休、CDDP: d8) | 35 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² /日 | 【21日間投与】 |
| | | 35 | 8 | ランダ注 | 60mg/m ² | 2時間かけて |
| 22 | mFOLFOX6 | 14 | 1 | エルプラット点滴静注液 | 85mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 14 | 1 | レボホリナート点滴静注用 | 200mg/m ² | 2時間かけて |
| | | 14 | 1 | 5-FU注 | 400mg/m ² | 15分かけて |
| | | 14 | 1 | 5-FU注 | 2400mg/m ² | 46時間かけて |
| 23 | サイラムザ+アブラキサン | 28 | 1 | サイラムザ点滴静注用 | 8mg/kg | 1時間かけて |
| | | 28 | 1 | アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m ² | 30分かけて |
| | | 28 | 8 | アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m ² | 30分かけて |
| | | 28 | 15 | サイラムザ点滴静注用 | 8mg/kg | 1時間かけて |
| | | 28 | 15 | アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m ² | 30分かけて |
| 24 | Weeklyアブラキサン(胃 Ca) | 28 | 1 | アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m ² | 30分かけて |
| | | 28 | 8 | アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m ² | 30分かけて |
| | | 28 | 15 | アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m ² | 30分かけて |
| 25 | TS-1+カンプト | 28 | 1 | カンプト点滴静注 | 70mg/m ² | 90分かけて |
| | | 28 | 1 | ティーエスワン配合OD錠 | 60mg/m ² /日 | 【14日間投与】 |
| | | 28 | 15 | カンプト点滴静注 | 70mg/m ² | 90分かけて |

2020/5/25 現在