

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/5/27 13:14

プロトコール名称 キイトルーダ®+PEM+CBDCA

同一グループ キイトルーダ®+PEM+CBDCA

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg ．．1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg ．．1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	デカドロン錠 4mg ．．1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼	朝昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて キイトルーダ点滴静注100mg/4ml テルモ生食 100ml	キープ側管から インラインフィルター使用 200 mg/Body 1 袋	d i v	10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) シリンジ生食注「ホ-ッ」 20ml ルートフラッシュ用	キープ側管から 1 i v 筒		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液P L「フソ-」 50ml	キープ側管から 3 A 1 瓶	d i v	10:35						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/5/27 13:14

プロトコール名称 キイトルダ®+PEM+CBDCA

同一グループ キイトルダ®+PEM+CBDCA

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	キープ側管から d i v 1 袋		10:45						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて アリムタ注射用 全量100mlとする 大塚生食注 2 0 ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 1 0 0 ml	キープ側管から d i v 500 mg/m ² 2 A 1 袋		11:00						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パラプラチン注射液 大塚生食注 2 5 0 ml	キープ側管から d i v 5 AUC 1 袋		11:10						
	ー以下余白ー									

コメント

参考文献