

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/5/27 13:14

プロトコール名称 キイトルダ®+PEM+CDDP;ショートハイﾄﾞﾚｰｼｵﾝ

同一グループ キイトルダ®+PEM+CDDP;ショートハイﾄﾞﾚｰｼｵﾝ

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /% 個/μ l	以下
好中球 個/μ l	以下	血小板 個/μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル1 2 5 mg ．．1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル8 0 mg ．．1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	デカドロン錠 4 mg ．．1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼	朝 昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 1 0 0 ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて 生理食塩液ﾊﾞｯｸAL「ﾌｿｰ」 5 0 0 m l 硫酸Mg補正液1mEq/ml 0. 5t l20ml 飲水励行して下さい	キープ側管から d i v 1 袋 8 m l		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて 生理食塩液P L 「ﾌｿｰ」 5 0 ml ルートフラッシュ用	キープ側管から d i v 全開で投与 1 瓶		11:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/5/27 13:14

プロトコール名称 キイトルーダ®+PEM+CDDP;ショートハイﾄﾞﾚｰｼｵﾝ

同一グループ キイトルーダ®+PEM+CDDP;ショートハイﾄﾞﾚｰｼｵﾝ

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μ l	以下	血小板 個/μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて キイトルーダ点滴静注 1 0 0 mg/4ml テルモ生食 1 0 0 ml	キープ側管から d i v インラインフィルター使用 200 mg/Body 1 袋		11:15						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて 生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 ml ルートフラッシュ用	キープ側管から d i v 全開で投与 1 瓶		11:45						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液 3 . 3 mg 1 ml アロキ点滴静注バック 0.75mg 50ml	キープ側管から d i v 3 A 1 袋		12:00						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて アリムタ注射用 全量100mlとする 大塚生食注 2 0 ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 1 0 0 ml	キープ側管から d i v 500 mg/m ² 2 A 1 袋		12:15						
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 45分かけて マンニトール S 注射液 3 0 0 m L	キープ側管から d i v 1 瓶		12:25						
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて ランダ注 生理食塩液バックAL「フソー」 5 0 0 m l	キープ側管から d i v 《遮光保存》 75 mg/m ² 1 袋		13:10						
	続き有り									

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/5/27 13:14

プロトコール名称 キイトルダ®+PEM+CDDP;ショートハイドレーション

同一グループ キイトルダ®+PEM+CDDP;ショートハイドレーション

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0~ 25 mL/min	%	G F R 0~ 25 mL/min	%
C C r 25~ 50 mL/min	%	G F R 25~ 50 mL/min	%
C C r 50~ 75 mL/min	%	G F R 50~ 75 mL/min	%
C C r 75~100 mL/min	%	G F R 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート)	点滴 (DIV)		14:10						
	60分かけて									
	ソルデム1輸液 500ml	1 袋								
	飲水励行してください									

ー以下余白ー

コメント

参考文献