

# プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/6/29 14:29

プロトコール名称 CMF

同一グループ CMF

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	エンドキサン錠 50mg ... 1日1回 朝食後	2 錠		朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
Rp 02	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液 3.3mg 1ml カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 3 A 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて 注射用メソトレキセート (LD) 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 40 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋		+00:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて 5-FU注☆ テルモ生食 100ml	キープ側管から div 600 mg/m <sup>2</sup> 1 袋		+00:45						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/6/29 14:29

プロトコール名称 CMF

同一グループ CMF

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	エンドキサン錠50mg ... 1日1回 朝食後	2 錠		朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
Rp 03	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼				
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 3 A 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて 注射用メソトレキセート (LD) 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 40 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋		+00:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて 5-FU注☆ テルモ生食 100ml	キープ側管から div 600 mg/m <sup>2</sup> 1 袋		+00:45						
-以下余白-										

コメント

参考文献