

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/6/30 10:40

プロトコール名称 FOLFOXIRI+アバスタチン

同一グループ FOLFOXIRI+アバスタチン, FOLFOXIRI+アバスタチン

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	9日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg ... 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg ... 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼	朝昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アロキ点滴静注バッグ0.75mg 50ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml	キープ側管から div 1 袋 3 A		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて アバスタチン点滴静注用 テルモ生食 100ml 90分→60分→30分	キープ側管から div 5 mg/kg 1 袋		+00:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 医師の指示どおりに 大塚糖液5% 100ml	ルートキープ 1 瓶		+01:45						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/6/30 10:40

プロトコール名称 FOLFOXIRI+アバスタン

同一グループ FOLFOXIRI+アバスタン, FOLFOXIRI+アバスタン

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	9日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて カンプト点滴静注 大塚糖液5% 250ml	キープ側管から 165 mg/m ² 1 袋	div	+01:45				
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて レボホリナート点滴静注用 大塚糖液5% 250ml	キープ側管から 200 mg/m ² 1 袋	div	+02:45				
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて エルプラット点滴静注液 大塚糖液5% 250ml	キープ側管から レボホリナートと同時投与 85 mg/m ² 1 袋	div	+02:45				
Rp 08	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 速度 2ml/hにて !!Total99ml!! 5-FU注☆ 生理食塩液PL「フソ」50ml Total99mlとする	48時間持続 48時間かけて ホームポンプC使用 3200 mg/m ² 1 瓶	civ 2ml/時	+04:45				

—以下余白—

コメント

参考文献