

プロトコルマスター内容

1 / 5

発行日時 2022/6/30 10:40

プロトコル名称 IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

同一グループ IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 疾患名 | 大腸癌 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 15日 | 承認者 | 加藤 遥平 |
| 休薬日数 | 13日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 加藤 遥平 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % |

| | | | |
|----------------|----|-----------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 |

| | | | |
|----------------|----|---------|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | 以上 |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | |

| | | | |
|----------------|----|----------|----|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | |
| 白血球 個/μl | 以下 | リンパ球 /% | 以下 |
| 好中球 個/μl | 以下 | 血小板 個/μl | 以下 |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|-------|--|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 処方 | 院内 | | | | | | | | | |
| Rp 01 | ティーエスワン配合OD錠 | | | 夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 |
| | 0.000m ² ~ 1.250m ² 80mg | | | | | | | | | |
| | 1.250m ² ~ 1.500m ² 100mg | | | | | | | | | |
| | 1.500m ² ~ 9999.999m ² 120mg | | | | | | | | | |
| | 【減量】 | | | | | | | | | |
| | 0.000m ² ~ 1.250m ² | | | | | | | | | |
| | 減量段階1 50mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階2 40mg | | | | | | | | | |
| | 1.250m ² ~ 1.500m ² | | | | | | | | | |
| | 減量段階1 80mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階2 50mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階3 40mg | | | | | | | | | |
| | 1.500m ² ~ 9999.999m ² | | | | | | | | | |
| | 減量段階1 100mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階2 80mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階3 50mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階4 40mg | | | | | | | | | |
| | .. 1日2回 朝・夕食後 | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 01 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) | ルートキープ | | 10:00 | | | | | | |
| | テルモ生食 100ml | 1 袋 | | | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) | キープ側管から | d i v | 10:00 | | | | | | |
| | 30分かけて | | | | | | | | | |
| | アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml | 1 袋 | | | | | | | | |
| | !!デキサート注射液 3.3mg 1ml | 2 A | | | | | | | | |
| | | | 続き有り | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 5

発行日時 2022/6/30 10:40

プロトコル名称 IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

同一グループ IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 疾患名 | 大腸癌 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 15日 | 承認者 | 加藤 遥平 |
| 休薬日数 | 13日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 加藤 遥平 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|-------|----|-----|-------|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN | mg/dL | 以上 | Scr | mg/dL |
| | | | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|-------|----|-----|-----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| AST | U/L | 以上 | ALT | U/L |
| T-Bil | mg/dL | 以上 | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|------------|----|------|------------|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 | 個/ μ l | 以下 | リンパ球 | /% |
| 好中球 | 個/ μ l | 以下 | 血小板 | 個/ μ l |
| | | | | 以下 |

.....
 日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|-------|--|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 03 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて アバスチン点滴静注用 90分→60分→30分 テルモ生食 100ml | キープ側管から | div 5 mg/kg | 10:30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 04 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 大塚生食注 250ml | キープ側管から | div 100 mg/m ² 1 袋 | 12:00 | | | | | | |
|-------|---|---------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|

続き有り

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

3 / 5

発行日時 2022/6/30 10:40

プロトコル名称 IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

同一グループ IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 疾患名 | 大腸癌 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 15日 | 承認者 | 加藤 遥平 |
| 休薬日数 | 13日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 加藤 遥平 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 | |

| | | | | |
|----------------|----|---------|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|----------------|----|----------------|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 個/ μ l | 以下 | リンパ球 /% | 以下 | |
| 好中球 個/ μ l | 以下 | 血小板 個/ μ l | 以下 | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|-------|--|--------------|------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 01 | テイーエスワン配合OD錠 | | | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 |
| | 0.000m ² ~ 1.250m ² | 80mg | | | | | | | | |
| | 1.250m ² ~ 1.500m ² | 100mg | | | | | | | | |
| | 1.500m ² ~ 9999.999m ² | 120mg | | | | | | | | |
| | 【減量】 | | | | | | | | | |
| | 0.000m ² ~ 1.250m ² | | | | | | | | | |
| | 減量段階1 | 50mg | | | | | | | | |
| | 減量段階2 | 40mg | | | | | | | | |
| | 1.250m ² ~ 1.500m ² | | | | | | | | | |
| | 減量段階1 | 80mg | | | | | | | | |
| | 減量段階2 | 50mg | | | | | | | | |
| | 減量段階3 | 40mg | | | | | | | | |
| | 1.500m ² ~ 9999.999m ² | | | | | | | | | |
| | 減量段階1 | 100mg | | | | | | | | |
| | 減量段階2 | 80mg | | | | | | | | |
| | 減量段階3 | 50mg | | | | | | | | |
| | 減量段階4 | 40mg | | | | | | | | |
| | ... 1日2回 朝・夕食後 | | | | | | | | | |
| | 続き有り | | | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 5

発行日時 2022/6/30 10:40

プロトコール名称 IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

同一グループ IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 疾患名 | 大腸癌 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 15日 | 承認者 | 加藤 遥平 |
| 休薬日数 | 13日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 加藤 遥平 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % |

| | | | |
|----------------|----|-----------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 |

| | | | |
|----------------|----|---------|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | 以上 |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | |

| | | | |
|----------------|----|----------|----|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | |
| 白血球 個/μl | 以下 | リンパ球 /% | 以下 |
| 好中球 個/μl | 以下 | 血小板 個/μl | 以下 |

.....
 日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (15) | | | | | | |
|-------|--|--------------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 処方 | 院内 | | | | | | | | | |
| Rp 01 | ティーエスワン配合OD錠 | | | 朝 | | | | | | |
| | 0.000m ² ~ 1.250m ² 80mg | | | | | | | | | |
| | 1.250m ² ~ 1.500m ² 100mg | | | | | | | | | |
| | 1.500m ² ~ 9999.999m ² 120mg | | | | | | | | | |
| | 【減量】 | | | | | | | | | |
| | 0.000m ² ~ 1.250m ² | | | | | | | | | |
| | 減量段階1 50mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階2 40mg | | | | | | | | | |
| | 1.250m ² ~ 1.500m ² | | | | | | | | | |
| | 減量段階1 80mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階2 50mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階3 40mg | | | | | | | | | |
| | 1.500m ² ~ 9999.999m ² | | | | | | | | | |
| | 減量段階1 100mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階2 80mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階3 50mg | | | | | | | | | |
| | 減量段階4 40mg | | | | | | | | | |
| | ... 1日2回 朝・夕食後 | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 01 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) | ルートキープ | | 10:00 | | | | | | |
| | テルモ生食 100ml | 1 袋 | | | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) | キープ側管から | d i v | 10:00 | | | | | | |
| | 30分かけて | | | | | | | | | |
| | アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml | 1 袋 | | | | | | | | |
| | !!デキサート注射液 3.3mg 1ml | 2 A | | | | | | | | |
| | | 続き有り | | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

5 / 5

発行日時 2022/6/30 10:40

プロトコル名称 IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

同一グループ IRIS+アバスチン (CPT-11 ; 100mg/m²)

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 疾患名 | 大腸癌 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 15日 | 承認者 | 加藤 遥平 |
| 休薬日数 | 13日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 加藤 遥平 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 | |

| | | | | |
|----------------|----|---------|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|----------------|----|----------------|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 個/ μ l | 以下 | リンパ球 % | 以下 | |
| 好中球 個/ μ l | 以下 | 血小板 個/ μ l | 以下 | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (15) | | | | | | |
|--------|--|---|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 03 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて アバスチン点滴静注用 90分→60分→30分 テルモ生食 100ml | キープ側管から 5 mg/kg 1 袋 | d i v | 10:30 | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 大塚生食注 250ml | キープ側管から 100 mg/m ² 1 袋 | d i v | 12:00 | | | | | | |
| -以下余白- | | | | | | | | | | |

コメント

参考文献