

プロトコールマスター内容

1 / 6

発行日時 2022/6/6

15:25

プロトコール名称 Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

同一グループ Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し AST U/L 以上 ALT U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下

好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml カイトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 100 mg/m ² 1 袋		10:20						
続き有り										

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 6

発行日時 2022/6/6

15:25

プロトコール名称 Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

同一グループ Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~ 25 mL/min % GFR 0~ 25 mL/min %

CCr 25~ 50 mL/min % GFR 25~ 50 mL/min %

CCr 50~ 75 mL/min % GFR 50~ 75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml カイトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 100 mg/m ² 1 袋		10:20						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2022/6/6

15:25

プロトコール名称 Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

同一グループ Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	36日	承認者	仲川 萌
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	仲川 萌
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml カイトル点滴静注パック 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 100 mg/m ² 1 袋		10:20						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 6

発行日時 2022/6/6

15:25

プロトコール名称 Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

同一グループ Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
 好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml カイトル点滴静注パック 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 100 mg/m ² 1 袋		10:20						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 6

発行日時 2022/6/6

15:25

プロトコール名称 Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

同一グループ Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml カイトル点滴静注パック 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 100 mg/m ² 1 袋		10:20						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

6 / 6

発行日時 2022/6/6

15:25

プロトコール名称 Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

同一グループ Weeklyパクリタキセル(食道Ca)

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者

仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
 好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (36)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml カイトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 100 mg/m ² 1 袋		10:20						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献