

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 XEIRI

同一グループ XEIRI+アバスチン

疾患名 大腸癌
診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方	院内									

Rp 01	ゼローダ錠 300mg			夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕
	0.000m ² ~ 1.310m ² 1800mg									
	1.310m ² ~ 1.690m ² 2400mg									
	1.690m ² ~ 2.070m ² 3000mg									
	2.070m ² ~ 9999.999m ² 3600mg									
	【減量】									
	0.000m ² ~ 1.310m ²									
	減量段階1 1200mg									
	1.310m ² ~ 1.690m ²									
	減量段階1 1800mg									
	減量段階2 1200mg									
	1.690m ² ~ 2.070m ²									
	減量段階1 2400mg									
	減量段階2 1800mg									
	減量段階3 1200mg									
	2.070m ² ~ 9999.999m ²									
	減量段階1 3000mg									
	減量段階2 2400mg									
	減量段階3 1800mg									
	.. 1日2回 朝・夕食後									

注射

Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート)	ルートキープ		10:00						
	テルモ生食 100ml	1 袋								

Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート)	キープ側管から	div	10:00						
	30分かけて									
	アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋								
	!!デキサート注射液 3.3mg 1ml	2 A								

続き有り

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/6/30 10:39

プロトコル名称 XEIRI

同一グループ XEIRI+アバスタチン

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	仲川 萌
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	仲川 萌
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ μ l	以下	リンパ球	%
好中球	個/ μ l	以下	血小板	個/ μ l
				以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 200 mg/m ² 1 袋		10:30						

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 XEIRI

同一グループ XEIRI+アバスチン

疾患名 大腸癌
診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	ゼローダ錠300mg			朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕
	0.000m ² ~ 1.310m ²	1800mg								
	1.310m ² ~ 1.690m ²	2400mg								
	1.690m ² ~ 2.070m ²	3000mg								
	2.070m ² ~ 9999.999m ²	3600mg								
	【減量】									
	0.000m ² ~ 1.310m ²									
	減量段階1	1200mg								
	1.310m ² ~ 1.690m ²									
	減量段階1	1800mg								
	減量段階2	1200mg								
	1.690m ² ~ 2.070m ²									
	減量段階1	2400mg								
	減量段階2	1800mg								
	減量段階3	1200mg								
	2.070m ² ~ 9999.999m ²									
	減量段階1	3000mg								
	減量段階2	2400mg								
	減量段階3	1800mg								
	.. 1日2回 朝・夕食後									
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 XEIRI

同一グループ XEIRI+アバスチン

疾患名 大腸癌
診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	ゼローダ錠300mg 処方 院内			朝						
	0.000m ² ~ 1.310m ² 1800mg									
	1.310m ² ~ 1.690m ² 2400mg									
	1.690m ² ~ 2.070m ² 3000mg									
	2.070m ² ~ 9999.999m ² 3600mg									
	【減量】									
	0.000m ² ~ 1.310m ²									
	減量段階1 1200mg									
	1.310m ² ~ 1.690m ²									
	減量段階1 1800mg									
	減量段階2 1200mg									
	1.690m ² ~ 2.070m ²									
	減量段階1 2400mg									
	減量段階2 1800mg									
	減量段階3 1200mg									
	2.070m ² ~ 9999.999m ²									
	減量段階1 3000mg									
	減量段階2 2400mg									
	減量段階3 1800mg									
	.. 1日2回 朝・夕食後									
	-以下余白-									

コメント

参考文献