

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/6/29 14:30

プロトコール名称 wパクリタキセル+アバスチン

同一グループ wパクリタキセル+アバスチン

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	レスタミンコーワ錠 10mg . . . 1日1回 化学療法前投与	3 錠		朝						
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサ-ト注射液3. 3mg 1ml ガスター-注射液20mg 2ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 瓶		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		+00:10						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 60~90mg/m ² 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 70 mg/m ² 1 袋		+00:25						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて アバスチン点滴静注用 90分→60分→30分 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 10 mg/kg 1 袋		+01:25						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/6/29 14:30

プロトコール名称 wパクリタキセル+アバスチン

同一グループ wパクリタキセル+アバスチン

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 02	レスタミンコーワ錠 10mg . . . 1日1回 化学療法前投与	3 錠		朝						
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサ-ト注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 瓶		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		+00:10						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 60~90mg/m ² 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 70 mg/m ² 1 袋		+00:25						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/6/29 14:30

プロトコール名称 wパクリタキセル+アバスチン

同一グループ wパクリタキセル+アバスチン

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
処方 (前投薬)	院内									
Rp 03	レスタミンコーワ錠 10mg ... 1日1回 化学療法前投与	3 錠		朝						
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサ-ト注射液3. 3mg 1ml ガスター-注射液20mg 2ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 瓶		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		+00:10						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 60~90mg/m ² 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 70 mg/m ² 1 袋		+00:25						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて アバスチン点滴静注用 90分→60分→30分 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 10 mg/kg 1 袋		+01:25						
		-以下余白-								

コメント

参考文献