

# プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 ABVD

同一グループ ABVD

疾患名 悪性リンパ腫

診療科 内科

投薬日数 19日

休薬日数 9日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 岡崎 一真

承認取消日時

承認取消者

更新者 岡崎 一真

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼	朝 昼			
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 瓶 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アロキ点滴静注バッグ0.75mg 50ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml	キープ側管から div 1 袋 3 A		+00:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アドリアシン注用 テルモ生食 100ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 25 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 1 A		+01:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて エクザール注射用10mg 生理食塩液PL「フソ」50ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 6 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶 1 A		+01:30						
続き有り										

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 ABVD

同一グループ ABVD

疾患名 悪性リンパ腫

診療科 内科

投薬日数 19日

休薬日数 9日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 岡崎 一真

承認取消日時

承認取消者

更新者 岡崎 一真

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ブレオ注射用 テルモ生食 100ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 10 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 1 A		+01:45						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ダカルバジン注用100 100mg 生理食塩液パックAL「フー」 500ml 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 《遮光保存》 375 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 1 A		+02:15						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 ABVD

同一グループ ABVD

疾患名 悪性リンパ腫

診療科 内科

投薬日数 19日

休薬日数 9日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 岡崎 一真

承認取消日時

承認取消者

更新者 岡崎 一真

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)		
処方	院内									
Rp 02	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼	朝 昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 瓶 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アロキ点滴静注バッグ0.75mg 50ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml	キープ側管から div 1 袋 3 A		+00:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アドリアシン注用 テルモ生食 100ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 25 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 1 A		+01:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて エクザール注射用10mg 生理食塩液PL「フソ」50ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 6 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶 1 A		+01:30						
続き有り										

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 ABVD

同一グループ ABVD

疾患名 悪性リンパ腫

診療科 内科

投薬日数 19日

休薬日数 9日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 岡崎 一真

承認取消日時

承認取消者

更新者 岡崎 一真

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ブレオ注射用 テルモ生食 100ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 10 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 1 A		+01:45				
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ダカルバジン注用100 100mg 生理食塩液パックAL「フー」 500ml 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から 《遮光保存》 375 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 1 A		+02:15				
		—以下余白—						

コメント

参考文献