

# プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/7/5

13:53

プロトコール名称 CHOP療法

同一グループ CHOP療法

疾患名 悪性リンパ腫(R-CHOP関連)  
 診療科 内科  
 投薬日数 5日  
 休薬日数 16日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時  
 承認者 小池 奈穂  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 岡崎 一真

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%		以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l		以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方	院内									
Rp 01	プレドニン錠 5mg ... 1日2回 朝・昼食後	20 錠		朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼		
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 瓶 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて カトル点静注パック 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		10:30						
Rp 04	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて オンコピン注射用 1mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から iv 1.4 mg/m <sup>2</sup> 2 A		11:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アドリアシン注用 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 50 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋		11:05						
										続き有り

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/7/5

13:53

プロトコル名称 CHOP療法

同一グループ CHOP療法

疾患名 悪性リンパ腫(R-CHOP関連)  
 診療科 内科  
 投薬日数 5日  
 休薬日数 16日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時  
 承認者 小池 奈穂  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 岡崎 一真

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下  
 好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液バックAL「ワ」 500ml	キープ側管から	div	11:35						
		750 mg/m <sup>2</sup>								
		3 A								
		1 袋								
		-以下余白-								

コメント

参考文献