

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 COP (CVP) 療法

同一グループ COP (CVP) 療法

疾患名 悪性リンパ腫(R-COP関連)
 診療科 内科
 投薬日数 5日
 休薬日数 16日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時
 承認者 小池 奈穂
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 小池 奈穂

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|-------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | mg/dL | 以上 |

| | | | | |
|----------------|----|---------|-----|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | U/L | 以上 |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|----------------|----|----------|------|----|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 個/μl | 以下 | リンパ球 /% | 個/μl | 以下 |
| 好中球 個/μl | 以下 | 血小板 個/μl | 個/μl | 以下 |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | | |
|-------|---|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|--|------|
| 処方 | 院内 | | | | | | | | | |
| Rp 01 | プレドニン錠 5mg ... 1日2回 朝・昼食後 | 20 錠 | | 朝 昼 | 朝 昼 | 朝 昼 | 朝 昼 | 朝 昼 | | |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 01 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml | ルートキープ 1 袋 | | 10:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml | キープ側管から div 1 瓶 1 袋 | | 10:00 | | | | | | |
| Rp 03 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて カトル点静注パック 3mg/50ml | キープ側管から div 1 袋 | | 10:30 | | | | | | |
| Rp 04 | 静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて オンコピン注射用 1mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】 | キープ側管から iv 1.4 mg/m ² 2 A | | 11:00 | | | | | | |
| Rp 05 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液パックAL「70」 500ml | キープ側管から div 750 mg/m ² 3 A 1 袋 | | 11:05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 以下余白 |

コメント

参考文献