

# プロトコルマスター内容

プロトコル名称 DP d (SC・4w・7回目以降用)

同一グループ

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	22日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 5/13	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 300mg ... 1日1回 化学療法前投与 ダラキューロ開始1~2時間前に服用	5錠		朝						
Rp 02	!!レナデックス錠 4mg ... 1日1回 化学療法前投与 ダラキューロ開始1~2時間前に服用	5錠		朝						
Rp 03	!!レナデックス錠 4mg ... 1日1回 朝食後	5錠			朝					
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 4mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	皮下注射 (23G翼状針) 5分かけて ダラキューロ配合皮下注	皮下 使用期限 : まで 1800 mg/Body		11:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 DP d (SC・4w・7回目以降用)

同一グループ

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	22日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 5/13	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 04	!!レナデックス錠 4mg .. 1日1回 朝食後	10 錠		朝						
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 4mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg .. 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/7/8

14:19

プロトコール名称 DP d (SC・4w・7回目以降用)

同一グループ

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	22日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 5/13	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 05	!!レナデックス錠 4mg .. 1日1回 朝食後	10 錠		朝						
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 4mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg .. 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/7/8

14:19

プロトコル名称 DP d (SC・4w・7回目以降用)

同一グループ

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	22日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 5/13	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)						
Rp 06	!!レナデックス錠 4mg ... 1日1回 朝食後	10 錠		朝						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献