

プロトコールマスター内容

1 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 E L d (3回目以降用)

同一グループ E L d (3回目以降用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0~ 25 mL/min % G F R 0~ 25 mL/min %

C C r 25~ 50 mL/min % G F R 25~ 50 mL/min %

C C r 50~ 75 mL/min % G F R 50~ 75 mL/min %

C C r 75~100 mL/min % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|-------|--|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01 | レブラミドカプセル5mg 0.000m ² ~ 9999.999m ² 25mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 20mg 減量段階2 15mg 減量段階3 10mg 減量段階4 5mg ... 1日1回 朝食後 | | | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 01 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml | ルートキープ 1 袋 | | 10:00 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml 生理食塩液P L 「フソ-」 50ml | キープ側管から d i v 10 A 1 瓶 | | 10:00 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 03 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg ガスター注射液20mg 2ml アセリオ静注液1000mg/100mlパック | キープ側管から d i v 1 A 1 A 1 袋 | | 10:30 | | | | | | |
| | | 続き有り | | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 E L d (3回目以降用)

同一グループ E L d (3回目以降用)

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|------|
| 疾患名 | 多発性骨髄腫 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 22日 | 承認者 | 仲川 萌 |
| 休薬日数 | 6日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 仲川 萌 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|-------|----|-----|-------|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN | mg/dL | 以上 | Scr | mg/dL |
| | | | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|-------|----|-----|-----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| AST | U/L | 以上 | ALT | U/L |
| T-Bil | mg/dL | 以上 | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|------------|----|------|------------|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 | 個/ μ l | 以下 | リンパ球 | /% |
| 好中球 | 個/ μ l | 以下 | 血小板 | 個/ μ l |
| | | | | 以下 |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|-------|--|------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 04 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて テルモ生食 100ml | 点滴 (DIV) | | 11:00 | | | | | | |
| Rp 05 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 1hr 300ml/hにて エムプリンティ点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚生食注 250ml インラインフィルター使用 | キープ側管から輸液ポンプで | div | 12:00 | | | | | | |
| | | 10 mg/kg 2 A 1 袋 | | | | | | | | |
| | | 続き有り | | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 E L d (3回目以降用)

同一グループ E L d (3回目以降用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0~ 25 mL/min % G F R 0~ 25 mL/min %

C C r 25~ 50 mL/min % G F R 25~ 50 mL/min %

C C r 50~ 75 mL/min % G F R 50~ 75 mL/min %

C C r 75~100 mL/min % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し

白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下

好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|------|-------------|--------------|------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 処方 | 院内 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 01 | レブラミドカプセル5mg 0.000m ² ~ 9999.999m ² 25mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 20mg 減量段階2 15mg 減量段階3 10mg 減量段階4 5mg .. 1日1回 朝食後 | | | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 |
|-------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|

注射

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 02 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) キープ側管から d i v 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 10 A 生理食塩液P L「フソ」50ml 1 瓶 | | | 10:00 | | | | | | |
| | 続き有り | | | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 E L d (3回目以降用)

同一グループ E L d (3回目以降用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (15) | day (16) | day (17) | day (18) | day (19) | day (20) | day (21) |
|-------|---|----------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 処方 | 院内 | | | | | | | | | |
| Rp 01 | レブラミドカプセル5mg 0.000m ² ~ 9999.999m ² 25mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 20mg 減量段階2 15mg 減量段階3 10mg 減量段階4 5mg .. 1日1回 朝食後 | | | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 01 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml | ルートキープ 1 袋 | | 10:00 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml | キープ側管から div 10 A 1 瓶 | | 10:00 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 03 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg ガスター注射液20mg 2ml アセリオ静注液1000mg/100mlパック | キープ側管から div 1 A 1 A 1 袋 | | 10:30 | | | | | | |
| | | 続き有り | | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 E L d (3回目以降用)

同一グループ E L d (3回目以降用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (15) | day (16) | day (17) | day (18) | day (19) | day (20) | day (21) |
|-------|--|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 04 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて テルモ生食 100ml | 点滴 (DIV) 1 袋 | | 11:00 | | | | | | |
| Rp 05 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 1hr 300ml/hにて エムプリンティ点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚生食注 250ml インラインフィルター使用 | キープ側管から輸液ポンプで 10 mg/kg 2 A 1 袋 | div | 12:00 | | | | | | |
| | | 続き有り | | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

6 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 E L d (3回目以降用)

同一グループ E L d (3回目以降用)

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|------|
| 疾患名 | 多発性骨髄腫 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 22日 | 承認者 | 仲川 萌 |
| 休薬日数 | 6日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 仲川 萌 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | | |
|---------------------|------|---------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| C C r 0~ 25 mL/min | % | G F R 0~ 25 mL/min | % | |
| C C r 25~ 50 mL/min | % | G F R 25~ 50 mL/min | % | |
| C C r 50~ 75 mL/min | % | G F R 50~ 75 mL/min | % | |
| C C r 75~100 mL/min | % | G F R 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-------------|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| B U N mg/dL | 以上 | S c r mg/dL | 以上 | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| A S T U/L | 以上 | A L T U/L | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|------------------|----|-----------|----|--|
| C B Cの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 個/μ l | 以下 | リンパ球 /% | 以下 | |
| 好中球 個/μ l | 以下 | 血小板 個/μ l | 以下 | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (22) | | | | | | |
|-------|--|------------------------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 02 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液P L 「フソ」 50ml | キープ側管から 10 A 1 瓶 | d i v | 10:00 | | | | | | |
| | | | ー以下余白ー | | | | | | | |

コメント

参考文献