

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 EPOCH

同一グループ EPOCH

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg ... 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg ... 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	プレドニン錠5mg 60mg/m <sup>2</sup> ... 1日2回 朝・昼食後	20 錠		朝昼	朝昼	朝昼	朝昼	朝昼		
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) キープ用 テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
			続き有り							

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/7/5

10:19

プロトコール名称 EPOCH

同一グループ EPOCH

疾患名 悪性リンパ腫

診療科 内科

投薬日数 5日

休薬日数 16日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 岡崎 一真

承認取消日時

承認取消者

更新者 岡崎 一真

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間持続 ラステット注 100mg 5ml オンコピン注射用 1mg アドリアシン注用 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液パックAL「フー」 500ml	点滴 (DIV) 《遮光保存》 50 mg/m <sup>2</sup> 0.4 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋		10:30	10:30	10:30	10:30			
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて 注射用エンドキサン 生理食塩液パックAL「フー」 500ml 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 750 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 3 A						10:30		
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて カイトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		17:30	17:30	17:30	17:30	17:30		
-以下余白-										

コメント

参考文献