

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 EPd (初回用)

同一グループ EPd (初回用)

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	22日	承認者	仲川 萌
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	仲川 萌
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m ² ~ 9999.999m ² 4mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から div 10 A 1 瓶		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg ガスター注射液20mg 2ml アセリオ静注液100mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 A 1 袋		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて テルモ生食 100ml	点滴 (DIV) 1 袋		11:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 EPd (初回用)

同一グループ EPd (初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 最初の30分 30ml/hにて 以後1hr 120ml/hにて エムプリシディ点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚生食注 250ml インラインフィルター使用	キープ側管から輸液ポンプで 次の30分 60ml/hにて	div	12:00						
		10 mg/kg								
		2 A								
		1 袋								
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 EPd (初回用)

同一グループ EPd (初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下

好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m ² ~ 9999.999m ² 4mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から div 10 A 1 瓶		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg ガスター注射液20mg 2ml アセリオ静注液100mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 A 1 袋		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて テルモ生食 100ml	点滴 (DIV) 1 袋		11:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 EPd (初回用)

同一グループ EPd (初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 最初の30分 180ml/hにて エムプリシテイ点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚生食注 250ml インラインフィルター使用	キープ側管から輸液ポンプで 以後1hr 240ml/hにて 10 mg/kg 2 A 1 袋	div	12:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 EPd (初回用)

同一グループ EPd (初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m ² ~ 9999.999m ² 4mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から div 10 A 1 瓶		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg ガスター注射液20mg 2ml アセリオ静注液100mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 A 1 袋		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて テルモ生食 100ml	点滴 (DIV) 1 袋		11:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

6 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 EPd (初回用)

同一グループ EPd (初回用)

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	22日	承認者	仲川 萌
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	仲川 萌
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1hr 300ml/hにて エムプリシディ点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚生食注 250ml インラインフィルター使用	キープ側管から輸液ポンプで	div	12:00						

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

7 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 EPd (初回用)

同一グループ EPd (初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ」50ml	キープ側管から div 10 A 1 瓶		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg ガスター注射液20mg 2ml アセリオ静注液1000mg/100mlバッグ	キープ側管から div 1 A 1 A 1 袋		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて テルモ生食 100ml	点滴 (DIV) 1 袋		11:00						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1hr 300ml/hにて エムプリシディ点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚生食注 250ml インラインフィルター使用	キープ側管から輸液ポンプで div 10 mg/kg 2 A 1 袋		12:00						
-以下余白-										

コメント

参考文献