

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 GDP

同一グループ GDP

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 テルモ生食 100ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 投与時間厳守 1000 mg/m ² 1 袋 2 A		10:45						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて 生理食塩液パックAL「フー」 500ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 0.5ml/20ml	キープ側管から div 1 袋 8 ml		11:15						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて マンニトールS注射液300mL	キープ側管から div 1 瓶		12:15						
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて ランダ注 生理食塩液パックAL「フー」 500ml	キープ側管から div 《遮光保存》 75 mg/m ² 1 袋		12:45						
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて ソルデム3A輸液 500ml	キープ側管から div 1 袋		13:45						
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて ソルデム3A輸液 500ml	キープ側管から div 1 袋		15:15						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 GDP

同一グループ GDP

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 A 1 袋		10:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 テルモ生食 100ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 投与時間厳守 1000 mg/m ² 1 袋 2 A		10:30						
-以下余白-										

コメント

参考文献