

# プロトコルマスター内容

プロトコル名称 KRd(2~12コース目)

同一グループ KRd(2~12コース目)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	レブラミドカプセル5mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 25mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 20mg 減量段階2 15mg 減量段階3 10mg 減量段階4 5mg .. 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 大塚糖液5% 100ml	ルートキープ 1 瓶		00:00	00:00					
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 大塚糖液5% 100ml	キープ側管から div 投与終了後ルートキープ全開で30秒流す 10 A 1 瓶		00:00						
注射										
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 大塚糖液5% 100ml	キープ側管から div 投与終了後ルートキープ全開で30秒流す 1 A 1 瓶			00:00					
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 7

発行日時 2022/7/8

14:17

プロトコール名称 KRd(2~12コース目)

同一グループ KRd(2~12コース目)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて カイプロリス点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚糖液5% 100ml 50ml抜いて使用	キープ側管から div 27 mg/m <sup>2</sup> 3 A 50 ml		00:30	00:30					
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

3 / 7

発行日時 2022/7/8

14:17

プロトコル名称 KRd(2~12コース目)

同一グループ KRd(2~12コース目)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 01	レブラミドカプセル5mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 25mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 20mg 減量段階2 15mg 減量段階3 10mg 減量段階4 5mg .. 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 大塚糖液5% 100ml	ルートキープ 1 瓶		00:00	00:00					
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 大塚糖液5% 100ml	キープ側管から div 投与終了後ルートキープ全開で30秒流す 10 A 1 瓶		00:00						
注射										
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 大塚糖液5% 100ml	キープ側管から div 投与終了後ルートキープ全開で30秒流す 1 A 1 瓶			00:00					
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

4 / 7

発行日時 2022/7/8

14:17

プロトコル名称 KRd(2~12コース目)

同一グループ KRd(2~12コース目)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて カイプロリス点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚糖液5% 100ml 50ml抜いて使用	キープ側管から div 27 mg/m <sup>2</sup> 3 A 50 ml		00:30	00:30					
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

5 / 7

発行日時 2022/7/8

14:17

プロトコール名称 KRd(2~12コース目)

同一グループ KRd(2~12コース目)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下  
 好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	レブラミドカプセル5mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 25mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 20mg 減量段階2 15mg 減量段階3 10mg 減量段階4 5mg .. 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 大塚糖液5% 100ml	ルートキープ 1 瓶		00:00	00:00					
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 大塚糖液5% 100ml	キープ側管から div 投与終了後ルートキープ全開で30秒流す 10 A 1 瓶		00:00						
注射										
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 大塚糖液5% 100ml	キープ側管から div 投与終了後ルートキープ全開で30秒流す 1 A 1 瓶			00:00					
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

6 / 7

発行日時 2022/7/8

14:17

プロトコル名称 KRd(2~12コース目)

同一グループ KRd(2~12コース目)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて カイプロリス点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚糖液5% 100ml 50ml抜いて使用	キープ側管から div 27 mg/m <sup>2</sup> 3 A 50 ml		00:30	00:30					
		続き有り								

コメント

参考文献

