

プロトコールマスター内容

1 / 6

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 SMILE (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2014/ 2/11	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 14時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV) 4 袋 2 A 1 瓶		19:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV) 1 袋 2 A 0.5 瓶		09:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg !!デキサート注射液3.3mg 1ml テルモ生食 100ml RP3・4・5は別ルートで	キープ側管から div 1 瓶 2 A 1 袋		10:00						
Rp 04	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 生食「CMX」20ml RP3・4・5は別ルートで	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:30						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 250ml RP3・4・5は別ルートで	点滴 (DIV) 4 袋 1 袋		10:35						
続き有り										

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 6

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコル名称 SMILE (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2014/ 2/11	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			10:00					
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて メソトレキセート点滴静注液 (HD) 生理食塩液「パッAL」 500ml	点滴 (DIV) 2000 mg/m ² 1 袋			11:00					
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 5時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg アミファーゲンP注20ml	点滴 (DIV) 1 袋 2 A 0.5 瓶 2 A			17:00					
Rp 09	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 生食「CMX」20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A			19:00					
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV) 1 袋 2 A 0.5 瓶			22:00					
注射										
Rp 11	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV) 1 袋 2 A 0.5 瓶				04:00				
続き有り										

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 SMILE (day1ナイトレションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2014/ 2/11	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 12	注射 点滴注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ロイコボリン注3mg 0.3%1ml	静注 (IV) 5 A				06:00 12:00 18:00	00:00 06:00 12:00 18:00	00:00 06:00 12:00 18:00	00:00	
Rp 13	注射 点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋				10:00	10:00	10:00		
Rp 14	注射 点滴注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 生食「CMX」20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A				10:00	10:00	10:00		
Rp 15	注射 点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml テルモ生食 100ml 投与開始後、薬局に連絡してください。	点滴 (DIV) 10 A 1 袋				10:05	10:05	10:05		
Rp 16	注射 点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ラステット注100mg 5ml 生理食塩液パックAL「フー」 500ml	キープ側管から div 使用期限 : まで 100 mg/m ² 1 袋				11:05	11:05	11:05		
Rp 17	注射 点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて 注射用イホマイド1g 生理食塩液パックAL「フー」 500ml テルモ生食 100ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 1500 mg/m ² 1 袋 1 袋				13:05	13:05	13:05		
続き有り										

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 6

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 SMILE (day1/イドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2014/ 2/11	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 18	点滴注射 (翼状針) 15分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	点滴 (DIV) イホマイドと同時開始 2 A 1 瓶				13:05	13:05	13:05		
Rp 19	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて テルモ生食 1L	点滴 (DIV) 1 袋				15:05	15:05	15:05		
Rp 20	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	点滴 (DIV) イホマイド開始4時間後から 2 A 1 瓶				17:05	17:05	17:05		
Rp 21	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 生食「CMX」20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A				19:00	19:00	19:00		
Rp 22	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	点滴 (DIV) イホマイド開始8時間後から 2 A 1 瓶				21:05	21:05	21:05		

続き有り

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

5 / 6

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコル名称 SMILE (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2014/ 2/11	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 23	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			10:00		10:00		10:00	
Rp 24	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 生食「CMX」20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A			10:00		10:00		10:00	
Rp 25	皮内注射 ロケゼ皮内テスト用 生食「CMX」20ml 30分間異常がないか確認	皮内 溶解後0.1ml分取しPSで全量1mlに 0.9 ml			10:00					
Rp 26	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて フィルター付専用輸液セット使用 ロイナーゼ注用5000 5,000KU単位 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液ハックAL「ワッ」 500ml	キープ側管から div 使用期限 : まで 6000 KU/ml ² 1 A 1 袋			10:35		10:05		10:05	
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

6 / 6

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 SMILE (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2014/ 2/11	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 23	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00		10:00		10:00		10:00
Rp 24	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 生食「CMX」20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:00		10:00		10:00		10:00
Rp 26	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて フィルター付専用輸液セット使用 ロイナーゼ注用5000 5,000KU単位 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液「ACKAL「フー」」 500ml	キープ側管から div 使用期限 : まで 6000 KU/m ² 1 A 1 袋		10:05		10:05		10:05		10:05

ー以下余白ー

コメント

参考文献