

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 VRD-lite

同一グループ VRD-lite

疾患名 多発性骨髄腫
 診療科 内科
 投薬日数 28日
 休薬日数 7日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時
 承認者 加藤 遥平
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下
 好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬) 院内									
Rp 01 レナデックス錠 4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝	朝					
処方 院内									
Rp 01 レブラミドカプセル 5mg 0.000m ² ~ 9999.999m ² 15mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 10mg 減量段階2 5mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射									
Rp 01 皮下注射 皮下 ベルケイド注射用 3mg 1.3 mg/m ² 大塚生食注 20ml 1 A 【↑↑溶解用☆】			10:00						
	続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 VRD-lite

同一グループ VRD-lite

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 28日

休薬日数 7日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者 加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
 好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	レナデックス錠 4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝	朝					
処方	院内									
Rp 01	レブラミドカプセル 5mg 0.000m ² ~ 9999.999m ² 15mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 10mg 減量段階2 5mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	皮下注射 ベルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/m ² 1 A		10:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 VRD-lite

同一グループ VRD-lite

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 28日

休薬日数 7日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者 加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 03	レナデックス錠 4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝	朝					
Rp 01	レブラミドカプセル 5mg 0.000m ² ~ 9999.999m ² 15mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 10mg 減量段階2 5mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	皮下注射 ベルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/m ² 1 A		10:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 VRD-lite

同一グループ VRD-lite

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 28日

休薬日数 7日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者 加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 04	レナデックス錠 4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝	朝					
	注射									
Rp 01	皮下注射 バルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/m ² 1 A		10:00						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献