

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 アドセトリス+CHP

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 6/22	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方	院内									
Rp 01	プレドニン錠 5mg ... 1日2回 朝・昼食後	20 錠		朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼		
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 瓶 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて カトリル点滴静注パック 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アドリアシン注用 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 50 mg/m ² 1 A 1 袋		11:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液パックAL「77」 500ml	キープ側管から div 750 mg/m ² 3 A 1 袋		11:30						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/7/5

10:19

プロトコール名称 アドセトリス+CHP

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 6/22	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)
Rp 06	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて シリンジ生食注「ホウカ」 20ml アドセトリス投与前フラッシュ	キープ側管から	i v	13:30				
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アドセトリス点滴静注用 50mg 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から	d i v	13:35				
Rp 08	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて シリンジ生食注「ホウカ」 20ml アドセトリス投与後フラッシュ	キープ側管から	i v	14:05				
-以下余白-								

コメント

参考文献