

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 ガザイバ単独(1コース目用)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2018/11/27	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ソル・マトロール静注用40mg (溶解液付) テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 瓶 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 袋		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 袋		11:00						
注射										
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 最初の30分 12.5ml/hにて 30分毎に12.5ml/hずつ上げる ガザイバ点滴静注1000mg インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml 1回 210ml使用	キープ側管から輸液ポンプで div 最大 100ml/hまで 1000 mg/Body 210 ml		11:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 ガザイバ単独(1コース目用)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2018/11/27	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ソル・マトロール静注用40mg (溶解液付) テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 瓶 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 袋		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 袋		11:00						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 最初の30分 25ml/hにて 30分毎に25ml/hずつ上げる ガザイバ点滴静注1000mg インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml 1回 210ml使用	キープ側管から輸液ポンプで div 最大 100ml/hまで 1000 mg/Body 210 ml		11:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 ガザイバ単独(1コース目用)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2018/11/27	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day(15)						
Rp 01	点滴注射(化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射(化学療法投与ルート) 30分かけて !!ソル・マトロール静注用40mg(溶解液付) テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 瓶 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射(化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 袋		10:30						
Rp 04	点滴注射(化学療法投与ルート) 30分かけて テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 袋		11:00						
Rp 06	点滴注射(化学療法投与ルート) 最初の30分 25ml/hにて 30分毎に25ml/hずつ上げる ガザイバ点滴静注1000mg インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml 1回 210ml使用	キープ側管から輸液ポンプで div 最大 100ml/hまで 1000 mg/Body 210 ml		11:30						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献