

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 ガザイバ+トレアキシシ(初回)

同一グループ ガザイバ+トレアキシシ(初回),ガザイバ+トレアキシシ(初回)

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00	10:00					
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサ-ト注射液3.3mg 1ml アキシ点滴静注バッグ0.75mg 50ml	キープ側管から div 3 A 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサ-ト注射液3.3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 3 A 1 袋			10:00					
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg アセリオ静注液1000mg/100mlバッグ	キープ側管から div 1 A 1 袋		10:30						
Rp 06	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて !!ソル・マトロール静注用40mg (溶解液付) 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 瓶 1 A		11:00						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 ガザイバ+トレアキシシ(初回)

同一グループ ガザイバ+トレアキシシ(初回), ガザイバ+トレアキシシ(初回)

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて 使用期限注意 トレアキシシ点滴静注用100mg/4mL 大塚生食注 250ml	キープ側管から 使用期限 : 90 mg/m ² 1 袋	div まで	11:05	10:30					
Rp 08	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて シリンジ生食注「ホッ」 20ml ルートフラッシュ	キープ側管から 1 筒	iv	12:05						
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 最初の30分 12.5ml/hにて 30分毎に12.5ml/hずつ上げる ガザイバ点滴静注1000mg インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml 1回 210ml使用	キープ側管から輸液ポンプで 最大 100ml/hまで 1000 mg/Body 210 ml	div	12:10						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 ガザイバ+トレアキシシ(初回)

同一グループ ガザイバ+トレアキシシ(初回),ガザイバ+トレアキシシ(初回)

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ソル・マトロール静注用40mg (溶解液付) テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 瓶 1 袋		10:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 袋		10:30						
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 袋		11:00						
Rp 11	点滴注射 (化学療法投与ルート) 最初の30分 25ml/hにて 30分毎に25ml/hずつ上げる ガザイバ点滴静注1000mg インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml 1回 210ml使用	キープ側管から輸液ポンプで div 最大 100ml/hまで 1000 mg/Body 210 ml		11:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 ガザイバ+トレアキシシ(初回)

同一グループ ガザイバ+トレアキシシ(初回),ガザイバ+トレアキシシ(初回)

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ソル・ドロール静注用40mg (溶解液付) テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 瓶 1 袋		10:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液10mg アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 袋		10:30						
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 袋		11:00						
Rp 11	点滴注射 (化学療法投与ルート) 最初の30分 25ml/hにて 30分毎に25ml/hずつ上げる ガザイバ点滴静注1000mg インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml 1回 210ml使用	キープ側管から輸液ポンプで div 最大 100ml/hまで 1000 mg/Body 210 ml		11:30						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献