

プロトコールマスター内容

1 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 サークリサ+Pd(4w・初回用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1

有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m ² ~ 9999.999m ² 4mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液 10mg ガスター注射液 20mg 2ml アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサ-ト注射液 3.3mg 1ml 生理食塩液 PL「フソ-」 50ml	キープ側管から div 75歳未満は 40mg 5 A 1 瓶		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて 生理食塩液 PL「フソ-」 50ml	キープ側管から div 1 瓶		11:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 サークリサ+Pd(4w・初回用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min

%

GFR 0~25 mL/min

%

CCr 25~50 mL/min

%

GFR 25~50 mL/min

%

CCr 50~75 mL/min

%

GFR 50~75 mL/min

%

CCr 75~100 mL/min

%

GFR 75~100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

BUN mg/dL

以上

Scr

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

AST

U/L

以上

ALT

U/L

以上

T-Bil

mg/dL

以上

CBCの検査結果値による警告

無し

白血球

個/ μ l

以下

リンパ球

%

以下

好中球

個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 投与速度は別紙参照 サークリサ点滴静注 インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml TOTAL 250ml とする	キープ側管から輸液ポンプで	div	11:15						
		10 mg/kg								
		1 袋								
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 サークリサ+Pd(4w・初回用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者

仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min

CCr 25~50 mL/min

CCr 50~75 mL/min

CCr 75~100 mL/min

%

%

%

%

GFR 0~25 mL/min

GFR 25~50 mL/min

GFR 50~75 mL/min

GFR 75~100 mL/min

%

%

%

%

腎機能の検査結果値による警告

BUN mg/dL

無し
以上

Scr

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

AST U/L

無し
以上

ALT

U/L

以上

T-Bil mg/dL

以上

CBCの検査結果値による警告

白血球 個/ μ l

無し
以下

リンパ球

/%

以下

好中球 個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m ² ~ 9999.999m ² 4mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液 10mg ガスター注射液 20mg 2ml アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサ-ト注射液 3.3mg 1ml 生理食塩液 PL「フソ-」 50ml	キープ側管から div 75歳未満は 40mg 5 A 1 瓶		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて 生理食塩液 PL「フソ-」 50ml	キープ側管から div 1 瓶		11:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

4 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 サークリサ+Pd(4w・初回用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min

%

GFR 0~25 mL/min

%

CCr 25~50 mL/min

%

GFR 25~50 mL/min

%

CCr 50~75 mL/min

%

GFR 50~75 mL/min

%

CCr 75~100 mL/min

%

GFR 75~100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上

Scr mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上

ALT U/L

以上

T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 個/ μ l 以下

リンパ球

/%

以下

好中球 個/ μ l 以下

血小板

個/ μ l

以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 投与速度は別紙参照 サークリサ点滴静注 インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml TOTAL 250ml とする	キープ側管から輸液ポンプで	div	11:15						
		10 mg/kg								
		1 袋								
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

5 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 サークリサ+Pd(4w・初回用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m ² ~ 9999.999m ² 4mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg .. 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液 10mg ガスター注射液 20mg 2ml アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサ-ト注射液 3.3mg 1ml 生理食塩液 PL「フソ-」 50ml	キープ側管から div 75歳未満は 40mg 5 A 1 瓶		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて 生理食塩液 PL「フソ-」 50ml	キープ側管から div 1 瓶		11:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

6 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 サークリサ+Pd(4w・初回用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min

%

GFR 0~25 mL/min

%

CCr 25~50 mL/min

%

GFR 25~50 mL/min

%

CCr 50~75 mL/min

%

GFR 50~75 mL/min

%

CCr 75~100 mL/min

%

GFR 75~100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

BUN mg/dL

以上

Scr

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

AST

U/L

以上

ALT

U/L

以上

T-Bil

mg/dL

以上

CBCの検査結果値による警告

無し

白血球

個/ μ l

以下

リンパ球

/%

以下

好中球

個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 投与速度は別紙参照 サークリサ点滴静注 インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml TOTAL 250ml とする	キープ側管から輸液ポンプで	div	11:15						
		10 mg/kg								
		1 袋								
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

7 / 7

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 サークリサ+Pd(4w・初回用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・初回用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day(22)	day(23)						
Rp 01	点滴注射(化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00							
Rp 02	点滴注射(化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレストール注射液10mg ガスター注射液20mg 2ml アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から div 1 A 1 A 1 袋		10:00							
Rp 03	点滴注射(化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ」50ml	キープ側管から div 75歳未満は40mg 5 A 1 瓶		10:30							
Rp 04	点滴注射(化学療法投与ルート) 15分かけて 生理食塩液PL「フソ」50ml	キープ側管から div 1 瓶		11:00							
Rp 05	点滴注射(化学療法投与ルート) 投与速度は別紙参照 サークリサ点滴静注 インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml TOTAL 250mlとする	キープ側管から輸液ポンプで div 10 mg/kg 1 袋		11:15							
		—以下余白—									

コメント

参考文献