

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 ベルケイドSC+ファリーダック(1~8コース目)

同一グループ

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	12日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	9日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)		
処方(前投薬)	院内									
Rp 05	レナデックス錠4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝						
Rp 06	!!レナデックス錠4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠			朝					
Rp 07	レナデックス錠4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠					朝			
Rp 08	!!レナデックス錠4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠						朝		
処方	院内									
Rp 02	ファリーダックカプセル 0.000m ² ~ 9999.999m ² 20mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 15mg 減量段階2 10mg ... 1日1回 朝食後			朝		朝		朝		
注射										
Rp 01	皮下注射 ベルケイド注射用3mg 大塚生食注 2.0ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/m ² 1 A		10:00			10:00			
			ー以下余白ー							

コメント

参考文献