プロトコールマスター内容

発行日時 2022/7/8 14:18

プロトコール名称 ベルケイドSC＋ファリーダック(9～16コース目)

同一グループ

疾患名 多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 12日
休薬日数 9日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時
承認者 加藤 遥平
承認取消日時
承認取消者
更新者 加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 mL/min	%		ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%	
ＣＣｒ 25～ 50 mL/min	%		ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%	
ＣＣｒ 50～ 75 mL/min	%		ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%	
ＣＣｒ 75～100 mL/min	%		ＧＦＲ 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	個/μl	以下	リンパ球	/%	以下
好中球	個/μl	以下	血小板	個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 処方（前投薬） 院内	１回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01 レナデックス錠４mg ．．1日1回 化学療法前投与	5	錠	朝						
Rp 02 !!レナデックス錠４mg ．．1日1回 化学療法前投与	5	錠		朝					
処方 院内									
Rp 01 ファリーダックカプセル 0.000㎡ ～ 9999.999㎡ 20mg 【減量】 0.000㎡ ～ 9999.999㎡ 減量段階1 15mg 減量段階2 10mg ．．1日1回 朝食後			朝		朝		朝		
注射									
Rp 01 皮下注射 ベルケイド注射用３mg 大塚生食注 ２０ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/㎡ 1 A		10:00						
	続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/7/8 14:18

プロトコール名称 ベルケイドSC＋ファリーダック(9～16コース目)

同一グループ

疾患名 多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 12日
休薬日数 9日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時
承認者 加藤 遥平
承認取消日時
承認取消者
更新者 加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 mL/min	%		ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%	
ＣＣｒ 25～ 50 mL/min	%		ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%	
ＣＣｒ 50～ 75 mL/min	%		ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%	
ＣＣｒ 75～100 mL/min	%		ＧＦＲ 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	個/μl	以下	リンパ球	/%	以下
好中球	個/μl	以下	血小板	個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 処方（前投薬） 院内	１回投与量（補正単位）	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)		
Rp 03 レナデックス錠４mg ．．1日1回 化学療法前投与	5	錠	朝						
Rp 04 !!レナデックス錠４mg ．．1日1回 化学療法前投与	5	錠		朝					
処方 院内									
Rp 02 ファリーダックカプセル 0.000㎡ ～ 9999.999㎡ 20mg 【減量】 0.000㎡ ～ 9999.999㎡ 減量段階1 15mg 減量段階2 10mg ．．1日1回 朝食後			朝		朝		朝		
注射									
Rp 01 皮下注射 ベルケイド注射用３mg 大塚生食注 ２０ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/㎡ 1 A		10:00						
	－以下余白－								

コメント

参考文献