

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/8/3

15:20

プロトコール名称 ADM+I F O

同一グループ ADM+I F O

疾患名	軟部悪性腫瘍	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg .. 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg .. 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 8時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml	ルートキープ 4 袋 4 A		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00		
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml カトルル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 袋		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
注射										
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて アドリアシン注用 大塚生食注 250ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 30 mg/m ² 1 袋 1 A		10:15	10:15					
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/8/3

15:20

プロトコール名称 ADM+I F O

同一グループ ADM+I F O

疾患名	軟部悪性腫瘍	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 4時間かけて 注射用イホマイド1g ウロミテキサンと同時投与 生理食塩液パックAL「フー」 500ml テルモ生食 100ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 2000 mg/m ²		12:15	12:15	10:15	10:15	10:15		
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml イホマイドと同時投与 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1.5 A 1 袋		12:15	12:15	10:15	10:15	10:15		
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ダイアモックス注射用500mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 瓶 1 袋		16:15	16:15	14:15	14:15	14:15		
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml RP4開始4時間後 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1.5 A 1 袋		16:15	16:15	14:15	14:15	14:15		
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) RP7とRP9の間に ビーフリード輸液 500ml	点滴 (DIV) 1 袋		16:45	16:45	14:45	14:45	14:45		
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/8/3

15:20

プロトコル名称 ADM+I F O

同一グループ ADM+I F O

疾患名	軟部悪性腫瘍	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml RP4開始8時間後 テルモ生食 100ml	点滴 (DIV) 1.5 A 1 袋		20:15	20:15	18:15	18:15	18:15		
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	点滴 (DIV) 1 袋		20:45	20:45	20:00	20:00	20:00		
-以下余白-										

コメント

参考文献