

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/8/3

15:22

プロトコール名称 NECO AP(q14d)

同一グループ NECO AP(q14d)

疾患名 骨肉腫

診療科 内科

投薬日数 5日

休薬日数 9日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下

好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 04	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 大塚生食注 20ml	キープ側管から 2 A 1 A	iv		10:00	10:00	10:00	10:00		
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ランダ注 テルモ生食 1L	キープ側管から 120 mg/m ² 1 袋	div	10:30						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間持続 アドリアシン注用 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液パッカAL「フー」 500ml	キープ側管から 30 mg/m ² 1 A 1 袋	div	16:30	16:30					
			—以下余白—							

コメント

参考文献