

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/8/3

15:20

プロトコール名称 VCD療法：アドリアシン（VCD/IE交替療法）

同一グループ VCD療法：アドリアシン（VCD/IE交替療法），VCD療法：アドリアシン（VCD/IE交替療法）

疾患名	軟部悪性腫瘍	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 01	イメンドカプセル125mg ．．1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg ．．1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	デカドロン錠 4mg ．．1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼	朝昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	1 袋	ルートキープ	10:00	10:00					
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アキシ点滴静注バッグ0.75mg 50ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml	1 袋 3 A	キープ側管から div	10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて オンコピン注射用1mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	1.5 mg/m ² 2 A	キープ側管から iv	10:30						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/8/3

15:20

プロトコール名称 VCD療法：アドリアシン (VCD/IE交替療法)

同一グループ VCD療法：アドリアシン (VCD/IE交替療法), VCD療法：アドリアシン (VCD/IE交替療法)

疾患名	軟部悪性腫瘍	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アドリアシン注用 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 37.5 mg/m ² 1 A 1 袋		10:35	10:30					
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 500ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液バックAL「フー」 500ml	キープ側管から div 1200 mg/m ² 1 瓶 1 袋		11:05						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ウロミテキサン注 400mg 4ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div エンドキサンと同時開始 2 A 1 袋		11:05						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて 生理食塩液バックAL「フー」 500ml メイロン静注 7% 20ml	点滴 (DIV) 1 袋 1 A		13:05						
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ダイアモックス注射用 500mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 瓶 1 袋		15:05						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/8/3

15:20

プロトコール名称 VCD療法：アドリアシン（VCD/IE交替療法）

同一グループ VCD療法：アドリアシン（VCD/IE交替療法），VCD療法：アドリアシン（VCD/IE交替療法）

疾患名	軟部悪性腫瘍	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div エンドキヤン開始4時間後開始 2 A 1 袋		15:05				
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15:35から19:05まで 生理食塩液パッカAL「フー」 500ml メイロン静注7% 20ml	点滴 (DIV) 1 袋 1 A		15:35				
Rp 11	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div エンドキヤン開始8時間後開始 2 A 1 袋		19:05				

—以下余白—

コメント

参考文献