

# プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/8/3

15:22

プロトコール名称 イホマイド (JCOG0905)

同一グループ イホマイド (JCOG0905)

疾患名	骨肉腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ $\mu$ l	以下	リンパ球	/%
好中球	個/ $\mu$ l	以下	血小板	個/ $\mu$ l
				以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg .. 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg .. 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝	朝	朝		
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml	ルートキープ 3 袋 3 A		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml カトルル点滴静注バッグ3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 袋		11:00	11:00	11:00	11:00	11:00		
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて 注射用イホマイド1g ウロミテキサンと同時投与 生理食塩液バッグAL「7」 500ml テルモ生食 100ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 2000 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 1 袋		11:15	11:15	11:15	11:15	11:15		
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/8/3

15:22

プロトコル名称 イホマイド (JCOG0905)

同一グループ イホマイド (JCOG0905)

疾患名	骨肉腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml イホマイドと同時投与 テルモ生食 100ml	キープ側管から 1 A 1 袋	d i v	11:15	11:15	11:15	11:15	11:15		
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml RP3開始4時間後 テルモ生食 100ml	キープ側管から 1 A 1 袋	d i v	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15		
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ダイアモックス注射用500mg 生理食塩液PL「フソ」50ml	キープ側管から 1 瓶 1 瓶	d i v	17:15	17:15	17:15	17:15	17:15		
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カトルル点滴静注バッグ3mg/50ml	点滴 (DIV) 1 袋		19:00	19:00	19:00	19:00	19:00		
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ウロミテキサン注400mg 4ml RP3開始8時間後 テルモ生食 100ml	キープ側管から 1 A 1 袋	d i v	19:15	19:15	19:15	19:15	19:15		
-以下余白-										

コメント

参考文献